

Patologia médica e gravidez

(21682) - DIABETES INSIPIDA E GRAVIDEZ

Tomás Eleazar Rivas¹; Marvina Romero¹

1 - Maternidade Conceição Palacios. Caracas - Venezuela

Introdução

Diabetes insípida é uma endocrinopatia infrequente cuja associação com a gravidez é apenas observada em 4 de cada 100.000 gestações. É definida como deficiência de arginina vasopressina (central ou neurogênica) ou resistência renal aos seus efeitos (periféricos ou nefrogênicos). Os sintomas incluem poliúria, polidipsia, hiponatremia, hiperosmolaridade plasmática e hipoosmolaridade urinária. O tratamento consiste em administração de desmopressina (análogo sintético de vasopressina). Em geral, não foi observado aumento das complicações maternas e fetais.

Objectivos

Relatar um caso clínico de diabetes insípida na gravidez.

Metodologia

Estudo Observacional, descritivo, sob a forma de relato de caso. As informações contidas foram obtidas a través de historia clínica.

Resultados

Trata-se de uma paciente de 19 anos, primigesta com diagnóstico de diabetes insípida a partir dos 5 anos de idade associada a microadenoma hipofisário, em tratamento com desmopressina intranasal 1 puff cada doze horas, que é encaminhada para nossa instituição com gravidez simples de 20 semanas mais 2 dias para começar o controlo pré-natal. Apresenta evolução satisfatória durante a gravidez. É realizado eco-sonogramas de padrão de crescimento, eco-sonograma morfológico e testes de bem-estar fetal, além de testes de função renal e eletrólitos séricos. Gestão em conjunto com o serviço endocrinologia e neurologia. É admitida no serviço sala de parto com gravidez simples de 40 semanas mais 6 dias, e opta-se por cesariana segmentar por apresentação pélvica, obtendo recém nascido vivo do sexo masculino, peso de 3600 gr e altura de 51 cm, sem complicações. Evolução no puerpério satisfactoria, tendo alta da instituição com o seu tratamento de rotina.

Conclusões

Diabetes insípida não afeta a fertilidade, o curso da gravidez, nem a via de resolução, mas deve ser conhecida para o adequado acompanhamento durante a gravidez. A desmopressina é segura e eficaz no tratamento desta doença portanto, seu uso deve ser mantido durante a gestação não possui efeito pressórico ou uterotônico.

Palavras-chave : diabetes insípida, gravidez, arginina vasopressina