

## **Outros**

### **(21702) - GRAVIDEZ EM CICATRIZ DE CESARIANA**

Joana Freire Gameiro<sup>1</sup>; Catarina Silva<sup>1</sup>; Antónia Santos<sup>1</sup>

1 - Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, E.P.E.

#### **Introdução**

A gravidez em cicatriz uterina é uma situação clínica rara em que uma gravidez é implantada na cicatriz de uma cesariana anterior, ou mais raramente na de uma miomectomia. A gravidez em cicatriz de cesariana (GCC) pode ser classificada em tipo 1 "na cicatriz" ou tipo 2 no seu interior "no nicho". A incidência de GCC tem aumentado, entre 1:1.800 a 1:2.226 gestações, devido ao aumento da taxa de partos cirúrgicos. A maioria ocorre com 2 ou mais cesarianas anteriores. Se não for reconhecida atempadamente ou se tratada inadequadamente, a GCC pode levar a desfechos maternos e fetais desfavoráveis e graves, tais como, ruptura uterina, choque hipovolémico e morte.

#### **Objectivos**

Rever um caso raro de GCC que ocorreu no nosso hospital em 2022.

#### **Metodologia**

Revisão do processo clínico da grávida.

#### **Resultados**

Grávida de 36 anos, referindo última menstruação há 5 semanas e 5 dias (BHCG 6 534mUI/mL) e índice obstétrico de 5025 - 5 cesarianas anteriores; que recorreu ao serviço de urgência por dor abdominal intensa na fossa ilíaca direita e perda hemática ligeira. A ecografia transvaginal, revelou saco gestacional com 15x8x10mm com vesícula vitelina visível, aparentemente localizado na região de cicatriz de cesariana anterior. Dada a hipótese de diagnóstico de GCC, manteve-se em vigilância seriada, tendo-se confirmado GCC tipo 1. Após discussão multidisciplinar do caso, optou-se por realizar tratamento com 2 tomas sequenciais de metotrexato ao 1.º e 7.º dia. Manteve-se atitude expectante com vigilância bioquímica e ecográfica seriada. Ao 33.º dia, por saco gestacional de maiores dimensões e episódio de hemorragia e algias pélvicas, optou-se por abordagem cirúrgica - aspiração transcervical sob controlo ecográfico - com subsequente resolução clínica e alta hemodinamicamente estável.

#### **Conclusões**

Reforça-se a importância da vigilância seriada e discussão, no diagnóstico, orientação e resolução desta patologia rara.

**Palavras-chave :** gravidez em cicatriz de cesariana