

Indicadores obstétricos

(21728) - GRAVIDEZ EM CICATRIZ DE CESARIANA: CASUÍSTICA NUM HOSPITAL TERCIÁRIO.

Mariana Gonçalves¹; Marta Costa¹; Sofia Monteiro¹; Anabela Rocha¹; Marina Moucho¹

1 - Centro Hospitalar Universitário São João

Introdução

A gravidez em cicatriz cesariana (GCC) refere-se à implantação anormal do saco gestacional na cicatriz ou nicho de cesariana anterior. Existem várias abordagens terapêuticas possíveis, sendo que não há consenso quanto à ideal.

Objectivos

Descrever a experiência na orientação dos casos de GCC diagnosticados no Centro Hospitalar e Universitário de São João, ao longo de 6 anos.

Metodologia

Trata-se de um estudo retrospectivo observacional, incluindo todas as GCC diagnosticadas de janeiro de 2017 a outubro de 2022 na nossa Instituição. Os dados foram obtidos através da consulta do processo clínico eletrónico (*Obscare*®, *Sclínico*® e *Astraia*®).

Resultados

Identificaram-se 9 casos de GCC, com idade gestacional média no diagnóstico de 7 semanas e 2 dias e atividade cardíaca fetal presente em 4 casos. A maioria das grávidas estava assintomática aquando do diagnóstico (n=5). O tratamento mais frequente foi a combinação de metotrexato sistémico e intrassacular (n=4), seguido do metotrexato sistémico isolado (n=3), metotrexato intrassacular (n=1) e atitude expectante (n=1). Houve registo de complicações em dois casos (um com laparotomia exploradora com ressecção em cunha e outro com esvaziamento intrauterino por aspiração). O tempo médio até declínio da beta HCG variou entre 14 a 54 dias. Após a resolução do quadro, houve neste período, 3 conceções espontâneas com parto a termo.

Conclusões

Não existe abordagem ideal na GCC, sendo consensual que quanto mais precoce for o diagnóstico e terapêutica, menor a incidência de complicações graves. A experiência da equipa é decisiva na escolha do tratamento. No nosso centro, a combinação de metotrexato sistémico e intrassacular é o tratamento preferencial, com elevada taxa de sucesso e baixa taxa de complicações.

Palavras-chave : Gravidez em cicatriz de cesariana, Metotrexato sistémico, Metotrexato intrassacular, Ecografia transvaginal