

Trabalho de parto

(21781) - MÚLTIPLAS CESARIANAS ANTERIORES, UMA INDICAÇÃO FORMAL PARA CESARIANA? – UMA REALIDADE DE 7 ANOS NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Filipe Nóbrega¹; Inês Leal¹; Inês Barradas¹; Inês Sargaço¹; Patrícia Silva¹; Manuel Sousa Gomes¹; Luís Farinha¹

1 - SESARAM

Introdução

O parto por cesariana (CS) tem se tornado uma via de parto cada vez mais frequente. Como consequência, verifica-se um maior número de grávidas com múltiplas cesarianas anteriores nos seus antecedentes obstétricos.

Objectivos

Descrição de parâmetros obstétricos nomeadamente o tipo de parto em grávidas com antecedentes de duas ou mais cesarianas anteriores.

Metodologia

Análise retrospectiva de 196 casos de grávidas com múltiplas CS anteriores (definida como duas ou mais CS), entre jan/2015 e dez/2021 no HNM. Foi analisado: idade materna no parto, idade gestacional, via de parto, número de CS anteriores, contraceção definitiva simultânea, achados intra-operatórios e complicações pós-operatórias.

Resultados

Foram analisados 196 casos de grávidas com antecedentes de múltiplas CS. A idade média no momento do parto foi 35 anos. A maioria (186) tinha 2 CS anteriores, 9 tinham 3 CS e 1 tinha 4 CS prévias. Todas as grávidas foram submetidas a cesariana: 134 CS eletivas, 61 CS urgentes e 1 CS emergente (bradicardia fetal). A idade gestacional média no parto foram 38,5s. Ocorreram 14 partos pré-termo (devido a rotura prematura pré-termo de membranas, hemorragia vaginal 3º trimestre, pré-eclâmpsia e cardiotocograma patológico). A maioria das mulheres optou por realizar contraceção definitiva no mesmo tempo operatório. O principal achados intra-operatórios foram aderências intra-abdominais com a bexiga e parede abdominal. Verificou-se um caso 1 rotura uterina (deiscência 1cm) detetado intraoperatoriamente. A taxa de complicações pós-operatórias foi baixa, verificando-se alguns casos de infeção da ferida cirúrgica, hemorragia pós-parto, 1 caso de hematometra e complicações relacionadas com os procedimentos anestésicos.

Conclusões

O antecedente de duas ou mais CS anteriores é uma indicação formal para parto por cesariana. Contudo, uma vez que as complicações pré-operatórias são raras, a tentativa de parto vaginal pode ser equacionada em casos selecionados.

As CS após 2 CS anteriores deve ser um procedimento eletivo e a taxa de complicações cirúrgicas é baixa.

Palavras-chave : cesariana; parto;