

## Resumos no âmbito da Hemorragia Pós-Parto | Poster

### PO - (21236) - COLOCAÇÃO INTRA-CESARIANA DE BALÃO DE BAKRI – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Inês Gil Dos Santos<sup>1</sup>; Carolina Moura<sup>1</sup>; Inês Castro<sup>1</sup>; Diana Vale<sup>1</sup>; Rosa Maria Rodrigues<sup>1</sup>; Jorge Braga<sup>1,2</sup>

1 - Centro Materno-Infantil do Norte; 2 - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar

#### Resumo

A Hemorragia Pós-Parto (HPP) pode ocorrer após parto vaginal ou cesariana e constitui uma emergência obstétrica; pode ser gerida com uma variedade de intervenções médicas e cirúrgicas, sendo a chave uma correta e atempada identificação e implementação de medidas eficazes.

O seguinte caso clínico ilustra uma situação de HPP após cesariana com aplicação intra-operatória de medidas de controlo da hemorragia.

Grávida de 34 anos, obesa. 3G2P (2 cesarianas anteriores). Gestação gemelar bicoriónica, complicada por HTA gestacional e diabetes gestacional 2ºT. Realização de cesariana eletiva às 36 semanas. Após encerramento da cavidade uterina, constatada atonia. Realizada massagem uterina bimanual e administração de fármacos uterotónicos, sem reversão do quadro. Procedeu-se a colocação intra-operatória de balão de Bakri. Monitorização da puérpera e desinflação de forma gradual ao longo de várias horas, com sucesso no controlo da hemorragia.

A HPP trata-se de uma complicação comum, potencialmente ameaçadora da vida. O tamponamento com balão intrauterino é uma forma rápida e eficaz de limitar a hemorragia, tendo o potencial de evitar a realização de uma histerectomia, permitindo permitir uma abordagem conservadora e recuperação bem-sucedidas.

**Palavras-chave :** Hemorragia pós-parto, Cesariana, Balão de Bakri