

Resumos no âmbito da Hemorragia Pós-Parto | Comunicação Livre

(21246) - TÉCNICA DE ALCIDES PEREIRA PARA CONTROLO DA HEMORRAGIA PÓS-PARTO – 9 ANOS DE EXPERIÊNCIA

Patrícia Nazaré¹; Beatriz Féria¹; Joana Figueiredo¹; Ana Beatriz Godinho¹; Alcides Pereira¹

1 - Hospital Garcia de Orta

Resumo

A hemorragia pós-parto representa uma causa importante de morbilidade e mortalidade materna, a nível global. Trata-se de uma emergência obstétrica e, embora apresente fatores de risco identificáveis, é muitas vezes imprevisível. A atonia uterina é a principal causa de hemorragia pós-parto, em cerca de 80% dos casos. Quando o tratamento médico é insuficiente na resolução do quadro, deverá ser adotada uma abordagem cirúrgica. As suturas uterinas compressivas são uma opção cirúrgica conservadora eficaz, evitando a morbilidade associada a uma histerectomia pós-parto e que potencialmente preserva a fertilidade futura.

Ao longo dos anos foram desenvolvidos vários tipos de suturas uterinas compressivas. Em 2005, Alcides Pereira *et al* descreveu uma nova técnica e apresentou os primeiros resultados relativos à sua aplicação, sendo que o procedimento foi eficaz nos 7 casos de atonia uterina referidos. A Técnica de Alcides Pereira envolve suturas transversais e longitudinais, que incluem apenas a serosa e miométrio subseroso, sem penetrar na cavidade uterina.

Este trabalho pretende apresentar os resultados do nosso centro relativamente à utilização da Técnica de Alcides Pereira, durante o período compreendido entre 2013 e 2021, nomeadamente quanto à eficácia da técnica, necessidade de técnicas adicionais e desfechos obstétricos após o procedimento.

Palavras-chave : Hemorragia pós-parto, Atonia uterina, Sutura uterina compressiva