

## Resumos no âmbito da Hemorragia Pós-Parto | Comunicação Livre

### PO - (21252) - NECROSE UTERINA EM CONTEXTO DE SUTURAS COMPRESSIVAS DE B-LYNCH – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Inês Jorge<sup>1</sup>; Sofia Rodrigues<sup>2</sup>; Gonçalo Dias<sup>1</sup>; Elsa Dias<sup>1</sup>; Carlos Veríssimo<sup>1</sup>

1 - Hospital Beatriz Ângelo; 2 - Maternidade Alfredo da Costa

#### Resumo

A atonia uterina é a principal causa de hemorragia pós-parto. Uma das modalidades terapêuticas, quando há falência da terapêutica médica, são as suturas uterinas compressivas. Apresenta-se um caso clínico sobre uma complicação associada a esta terapêutica cirúrgica.

Grávida de 34 anos, saudável, antecedentes de um parto eutócico e gestação atual sem intercorrências. Admitida em trabalho de parto às 40 semanas + 2 dias. Realizou-se cesariana urgente por distócia, com quadro de atonia uterina refratária à terapêutica médica. Realizaram-se suturas hemostáticas de B-Lynch. Puerpério complicado por íleo intestinal, resolvido com terapêutica médica, tendo tido alta ao 5º dia. Recorreu ao serviço de urgência ao 8º dia de puerpério por dor e distensão abdominal, com vômitos e paragem de emissão de gases e fezes. O estudo analítico constatou elevação dos parâmetros de infeção e a TC abdomino-pélvica revelou conteúdo aéreo intrauterino e marcada distensão intestinal. Por suspeita de foco infeccioso intra-abdominal, foi submetida a laparotomia exploradora. Constatou-se necrose uterina e isquémia intestinal focal, multi-segmentar. Efetuou-se histerectomia total. O pós-operatório decorreu sem intercorrências, cumpriu antibioterapia endovenosa e teve alta ao 9º dia.

Apesar das suturas uterinas representarem uma terapêutica cirúrgica eficaz para a atonia uterina, estas associam-se possíveis complicações, nomeadamente necrose uterina.

**Palavras-chave :** atonia uterina, suturas compressivas B-Lynch, necrose uterina, sépsis