

(21261) - AVALIAÇÃO DO RISCO DE HEMORRAGIA PÓS-PARTO À ADMISSÃO: ANÁLISE RETROSPECTIVA DOS CASOS DIAGNOSTICADOS NO HOSPITAL PEDRO HISPANO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Mariana Valente Abreu¹; Mónica Calado Araújo¹; Beatriz Maria Neves¹; Sílvia Alves Torres¹; Adelina Sá Couto¹

1 - Unidade Local de Saúde de Matosinhos

Resumo

A hemorragia pós-parto (HPP) é a principal causa de morte materna a nível mundial. Os fatores que predis põem a HPP são múltiplos, podendo ser avaliados através de ferramentas de avaliação de risco.

O objetivo deste trabalho é verificar a concordância entre o risco à admissão de HPP e a sua ocorrência, de modo a prever e potencialmente prevenir este desfecho.

Foi efetuada a análise dos casos de HPP registados na plataforma ObsCare® do Hospital Pedro Hispano entre 2017 e 2021 e pesquisada a presença dos fatores de risco contemplados no score fornecido pela ACOG, por forma a dividir os casos em grupos de baixo, intermédio ou alto risco.

Foram incluídas 160 ocorrências de HPP, das quais 2% apresentavam alto risco à admissão, 12% risco intermédio e 86% risco reduzido, pelo que o score aplicado demonstrou ter um valor preditivo positivo insatisfatório para a HPP nesta amostra.

De facto, num estudo realizado em 2021 em que foram utilizados três scores distintos (incluindo o da ACOG), verificou-se que 40% dos casos de HPP se davam em grávidas consideradas de baixo risco.

Deste modo, a vigilância ativa da HPP deve ser instituída em todas as parturientes, independentemente do risco determinado à admissão.

Palavras-chave : hemorragia pós-parto, fatores de risco, mortalidade materna