

Outros

(21536) - ANÁLISE ESTATÍSTICA RETROSPECTIVA DAS INTERRUPÇÕES MÉDICAS DA GRAVIDEZ NO CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VEISEU, E.P.E.

Catarina Toscano¹; Maria Vilaça¹; Isabel Cerveira¹; Fernando R.Santos¹; Isabel Torres¹

1 - Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E

Introdução

A Legislação Portuguesa prevê a Interrupção Médica de Gravidez (IMG) de acordo com a Lei nº16/2007, de 17 de abril.

Para a proteção dos direitos humanos, as Nações Unidas estabelecem que “nas circunstâncias onde o aborto não é contra a lei, os sistemas de saúde devem treinar e equipar os serviços de saúde de forma que o aborto seja acessível e seguro para salvaguardar a saúde da mulher”.

Objectivos

Analisar os casos de IMG realizados no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. (CHTV) entre 2015 e 2021.

Metodologia

Foram consultados os processos clínicos das IMG entre 2015 e 2021.

Resultados e Conclusões

O número total de IMG neste período foi 165, com menos casos em 2016 (13), e 2018 com mais casos (34).

A mediana de idade das grávidas foi 35 anos. A Gesta média foi de 2. A Idade Gestacional média aquando da IMG foi de 17 semanas. O índice de massa corporal médio das grávidas na 1ª ecografia foi 25,3 kg/m².

Relativamente a antecedentes obstétricos, 1 dos casos tinha uma IMG anterior por Trissomia 21 (T21). Em 22,4% dos casos houve previamente 1 aborto espontâneo (AE) no 1º Trimestre e em 6,1% ≥ 2 AE.

A principal indicação para IMG foi anomalia cromossómica (57%), sendo destas a mais comum a T21 (54,3%). Das anomalias cromossómicas, 92,6% dos casos tinham realizado o Rastreio Combinado do 1ºT, havendo destes casos 93,1% com alto risco e 69% com Translucência da Nuca aumentada.

Das anomalias estruturais, as mais comuns foram as anomalias do sistema nervoso central (52,1%) seguida das anomalias do aparelho urinário (31%) e anomalias do aparelho circulatório (26,8%).

Esta análise estatística realça a importância da realização de exames precoces de rastreio com vista à identificação de anomalias e promover um correto diagnóstico pré-natal. A importância desta abordagem precoce permite o aconselhamento do casal relativamente ao término da gravidez.

Palavras-chave : Diagnóstico pré-natal, Interrupção Médica da Gravidez, Anomalia Cromossómica, Anomalia Estrutural