

## **Resumos sobre Casos clínicos em Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal | Poster**

### **PO - (21912) - FENDA FACIAL TRANSVERSA – CASO CLÍNICO**

Ana Sofia Carneiro<sup>1</sup>; Mara Macieira<sup>1</sup>; Carla Duarte<sup>1</sup>; Adosinda Rosmaninho<sup>1</sup>; Elsa Pereira<sup>1</sup>

1 - Hospital Senhora da Oliveira Guimarães

#### **Resumo**

#### **Introdução**

A fenda facial transversa ou número 7 na classificação de fendas faciais de Tessier é uma anomalia congénita rara (incidência 1:60000-300000 nados vivos) e está comumente associada a anomalias do 1º e 2º arcos branquiais ou síndrome de bandas amnióticas. A extensão destas fendas é variável e nas formas mais severas pode atingir o pavilhão auricular, condicionando elevada limitação funcional.

#### **Caso Clínico**

Reportamos um caso clínico diagnosticado no nosso centro de diagnóstico pré-natal em 2012.

35 anos, saudável, IV G/I P/II AE. Gestação espontânea. Rastreio Combinado do 1º Trimestre com risco reduzido para aneuploidias. Na ecografia do 2º Trimestre foi evidente micrognatia e sulco oro-facial unilateral esquerdo associado a hidrâmnios ligeiro (ILA-27). Foi realizada amniocentese às 22 semanas com cariótipo normal e a pesquisa por síndrome de banda amniótica foi negativa.

Após discussão multidisciplinar o casal decidiu realizar interrupção médica da gravidez às 23 semanas e 5 dias.

Do estudo anatomopatológico identificou-se feto feminino com fenda facial oblíqua lateral à esquerda, micrognatia e morfologia anómala do pavilhão auricular esquerdo.

#### **Discussão**

A maioria dos casos descritos na literatura tratam-se de diagnósticos pós-natais, pelo que este caso clínico reforça a importância da observação detalhada da face fetal na ecografia morfológica.

**Palavras-chave : fenda facial transversa**