

Resumos sobre Casos clínicos em Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal | Comunicação Livre

PO - (21949) - EDEMA VULVAR EXUBERANTE - UMA COMPLICAÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPسيا?

Sofia Albuquerque Brás¹; Francisca Magno¹; Marta Plancha¹; Inês Palma Dos Reis¹; Dusan Djokovic¹; Ana Isabel Machado¹

1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC)

Resumo

Introdução: O edema vulvar exuberante é uma complicação rara da pré-eclâmpسيا, especialmente no pós-parto.

Caso: Grávida de 30 anos, saudável, com um parto eutócico anterior. A gravidez foi vigiada, com diagnóstico de restrição de crescimento fetal grave e precoce, de causa vascular, com fluxometria fetal normal. Recorre ao SU com 27 semanas e 1 dia com quadro de elevação tensional grave, cefaleia, escotomas, edema da face e membros. Analiticamente a destacar razão proteínas/creatinina urinária 2583 mg/g e rácio Sflt1/PLGF 225. Foi internada por pré-eclâmpسيا com critérios de gravidade, fez sulfato de magnésio profilático, ciclo de maturação pulmonar e controlo tensional com labetalol. Evoluiu com agravamento clínico, da função renal (creatinina 1.29 mg/dL) e ascite, pelo que às 29 semanas foi submetida a cesariana, com extração de nado-vivo, sexo feminino, 925g, IA 7/8/9. Foram retirados 2,5L de líquido ascítico intra-operatoriamente. Após o parto, desenvolveu um edema exuberante do grande lábio direito, com agravamento nas horas seguintes e extensão à região supra-púbica. A ecografia transperineal confirmou edema e excluiu coleções de líquido. Analiticamente destacava-se hipoalbuminemia e hipoproteinemia. Iniciou terapêutica com albumina, dieta hiperproteica e furosemida. Teve alta ao quinto dia pós-parto, com função renal e albumina normalizadas e regressão franca do edema.

Palavras-chave : pré-eclâmpسيا, edema vulvar