

Resumos sobre Casos clínicos em Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal | Poster

PO - (21978) - SÍNDROME DE HELLP ATÍPICO – UM CASO DE MORTE FETAL E DISFUNÇÃO MULTIORGÂNICA MATERNA

Ana Sofia Ramos¹; Inês Martins¹; Teresa Caldeira¹; Nuno Costa²; Madalena Antunes¹; Filomena Nunes¹; Constança Fernandes¹

1 - Hospital de Cascais; 2 - CHULN

Resumo

Introdução:

O Síndrome de HELLP cursa com hemólise, elevação das enzimas hepáticas e trombocitopenia, tendo, por vezes, um curso atípico, com disfunção multiorgânica, que pode culminar na morte materna e fetal.

Caso:

Primigesta de 25 anos, saudável. Gravidez mal vigiada, de 36s+3d, recorreu ao SU por dor abdominal, vômitos e ausência de movimentos fetais. Encontrava-se normotensa e normocárdica. Na ecografia identificou-se um feto sem batimentos cardíacos. A avaliação analítica inicial revelou hemoconcentração, trombocitopenia, aumento dos tempos de coagulação, disfunção hepática e renal, sem proteinúria. Após a indução do trabalho de parto, nasceu um nado morto sem alterações morfológicas aparentes. No pós-parto, constatou-se um quadro de disfunção multiorgânica, com coagulação intravascular disseminada (CID), envolvimento neurológico (um episódio de convulsão tonico-clónica generalizada), agravamento da lesão renal e hepática e esteatose hepática. Assumiu-se um diagnóstico de síndrome de HELLP atípico, com provável *overlap* com fígado gordo agudo da gravidez.

O estudo da morte fetal evidenciou sinais de anóxia aguda e má perfusão placentar.

Conclusões:

Este caso ilustra a imprevisibilidade do curso clínico do Síndrome de HELLP e do seu envolvimento multissistémico, alertando para a importância do reconhecimento atempado de sinais de alarme e da abordagem multidisciplinar das grávidas e puérperas com esta patologia.

Palavras-chave : Síndrome de HELLP, Morte Fetal, Disfunção Multiorgânica