

## Resumos sobre Casos clínicos em Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal | Poster

### PO - (22001) - SÍNDROME VERTIGINOSO SEVERO INTRAPARTO - UMA INDICAÇÃO POUCO COMUM PARA CESARIANA

Maria Inês Sargaço<sup>1</sup>; Estefânia Ferreira<sup>1</sup>; Mariana Narciso<sup>1</sup>; Maria Inês Barradas<sup>1</sup>

1 - Hospital Central do Funchal

#### Resumo

A vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) é caracterizada por episódios paroxísticos agudos e breves de vertigem rotacional induzida por mudanças na posição da cabeça. A etiologia é idiopática na maioria dos casos, mas pode ser secundária a outras patologias. Alguns estudos correlacionam um aumento dos episódios com alterações hormonais como o início de contraceção hormonal ou a gravidez.

Grávida, 29 anos, antecedentes de VPPB, 41 semanas, sem episódios durante a gravidez, é submetida a analgesia epidural precoce na fase latente do trabalho de parto por dor resistente, que decorreu sem intercorrências. Três horas depois, inicia quadro súbito de vertigem rotacional severa, náuseas e vômitos, associado a nistagmo rotatório horizontal direito. A vertigem era desencadeada com o mínimo movimento da cabeça. Na tentativa de reverter o quadro foi medicada com ondasetrom e metoclopramida, sem qualquer efeito. Pela sintomatologia exuberante e limitante foi decidida cesariana por patologia que impossibilitava a colaboração materna no parto vaginal. Após o parto permaneceu medicada com metoclopramida, sem novos episódios.

A associação entre VPPB e gravidez é incerta mas há relatos de agravamento durante a gravidez. Este caso é inédito dado a sua única apresentação na gravidez se ter dado durante o período do trabalho de parto.

**Palavras-chave :** vertigem posicional paroxística benigna, síndrome vertiginoso, cesariana, trabalho de parto